

Vyšetření pomocí CT (počítačové tomografie)

Před CT vyšetřením bez nitrožilní aplikace kontrastní látky (napr. páteře, kostí, kloubů, ...) není nutná žádná speciální příprava.

Před CT vyšetřením s případnou nitrožilní aplikací kontrastní látky (o které rozhoduje radiolog), včetně vyšetření cév (angiografie), se dostavíte nalačno, tzn. minimálně 4 hodiny nejíst a nekouřit. Dvě hodiny před vyšetřením užijete antihistaminika, obvykle dvě tablety Dithiadenu, jako prevenci možné alergické reakce. Malé množství nesyčené tekutiny (asi 100 ml) na zahánění žízně nebo zapití tablet vypít můžete.

Před CT vyšetřením břicha a malé pánve je někdy potřeba naplnit střeva kontrastní látkou, kterou i s přiloženým návodem obdržíte před vyšetřením (buď na CT pracovišti nebo na nemocničním oddělení). Je nezbytně nutné dodržet pokyny uvedené v návodě. Po zhodnocení první série skenů, radiolog zváží příp. nitrožilní aplikaci kontrastní látky, proto i zde je nutné dodržet pokyny z předchozího odstavce.

Akutní vyšetření se provádějí bez speciální přípravy.

Důležité upozornění: Nitrožilně aplikujeme kontrastní látku s obsahem jódu. Pokud jste na jod alergická/-ý, vždy to oznamte před vyšetřením personálu CT pracoviště (radiologický asistent, lékař).

Rovněž upozorněte, jestli se léčíte s onemocněním ledvin (cukrovka, ledvinová nedostatečnost, kamínky, a pod.) nebo štítné žlázy. V těchto případech vyžadujeme vyjádření odborného lékaře.

